

در سوم بالای ۶۰ سال: (۱۱/۱۳) ۴۰/۷۵ نفر از ۴۰/۶۴ نفر  
 که واکسن در اول دانش آموزان: (۹۶/۸) ۴۵/۵۴ نفر از ۲۱۲/۲۷ نفر  
 واکسن در دوم دانش آموزان: (۸۱/۵) ۱۷۲/۹۱ نفر از ۲۱۲/۲۷ نفر  
 واکسناسیون بالای ۶۰ سال: ۹۵/۲٪  
 واکسناسیون ۵۰ الی ۶۰ سال: ۹۶/۹٪  
 واکسناسیون ۴۰ الی ۵۰ سال: ۹۰/۷٪  
 واکسناسیون ۳۰ الی ۴۰ سال: ۸۷٪  
 واکسناسیون ۲۰ الی ۳۰ سال: ۸۵٪

**راه مقابله با ویروس آمیکرون چیست؟**

از رایج‌ترین راه مقابله با ویروس آمیکرون در کشورهای مختلف شناسایی شده و به دلیل رایج‌ترین بالای این نوع جنس، نگرانی‌های وجود دارد و در مطالعات مختلف مشاهده شده که در کشورهای افریقایی، میزان واکسناسیون خیلی پایین‌تر از ۴۰ درصد بوده، این جهش در کرونا رخ داده البته جهش‌های متعددی در کرونا ایجاد شده و شاید بیش از ۵۰ نوع جهش ایجاد و باعث به وجود آمدن جهش آمیکرون شده باشد.

مهم‌ترین راه مقابله با ویارانت آمیکرون های جدید ویروس و جمله آمیکرون، واکسناسیون، رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیت های مادی و مزری می باشد. به ویژه کتایب‌هایی است که با کشورهای افریقایی رفت و آمد دارند مستند دارند. در حال حاضر برخی کشورهای اروپایی، محدودیت هایی را در رهای خود ایجاد کرده اند و این موارد در کمیته علمی بررسی و افزایش همکاری واکسناسیون، لزوم رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی و تزریق دژ فافه یا یادآور تاکید شد.

کنون در استان مازندران حدود ۹۴ درصد از جمعیت دهالی بالای ۱۲ سال های واکسناسیون شد و اول و حدود ۸۳ درصد نیز در دوم واکسن کردند و یقی تزریق کرده اند. افرادی که نسبت به واکسن نمی زند باعث افزایش ویروس در گردش جامعه می شوند و موج اپیدمی ها، پاندمی ها و موج های کرونا از افراد واکسناسیون شده می شوند.

قرن سوم اویس سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اشاره به اینکه واکسن زده ها این تر از واکسن نزده ها هستند اظهار داشت: مطالعاتی که در دنیا و ایران انجام شده خیلی آهانه داده افرادی که به واکسن تزریق شده اند، نسبت به واکسن نزده ها خیلی اندک تر بوده اند که از آن بستر در بیمارستان مرگ و میر غیرواکسنه ها خیلی بیشتر از واکسنه ها و واکسن تزریق کرده و در برابر این توصیه می شود که حتماً واکسناسیون با پوشش بالا انجام شود. مطالعات هم نشان داده اند که تزریق واکسن کرونا در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی از مهمترین روش های پیشگیری در بیمارستان و مرگ و میر بیماران کرونایی شود.

وی بستر در بیمارستان و مرگ و میر بیماران کرونایی شود. ضرورت رعا دی تر پروتکل های بهداشتی و زیرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دراین مورد گفت: بهر صورت کنیم علیرغم تمام اقداماتی که انجام می دهیم به ما نمی رسد، از رهن آسان و امکان درگیری کشور ما هم زیاد است. سری رعایت جید پروتکل های بهداشتی ضرورت دارد.

عادی انگاری ممنوع!

ترویس‌های تاجیک کرد: مردم تصور نکنند چون واکسن زده، های کمپ تمام زده و عادی انگاری صورت گیرد، زیرا متأسفانه در زمینه رعایت پروتکل های استفاده از ماسک و فاصله گذاری، از سوی مردم کوتاهی می شود. اما علما شدت مرگ و میر با تزریق واکسن کاهش می یابد پس باید به مردم ویم که اگر در دنیا واکسن برای کودکان بالای ۳ سال هم ساخته شده به را وارد کرده و اقدام کنیم. نباید به پوشش ۹۰ درصدی اکتفا کنیم، بلکه باید واکسناسیون را به نزدیک ۹۵ درصد رسانیم.